MG' COLLAR

MgCollar - Collar impregnado para ovinos

Repelente para ovino (*Ovis aries*) frente a moscas (TP19).

Composición biocidas:
Chrysanthemum cinerariaefolium (CAS: 89997-63-7): 9.75 g/kg
Lavandin oil (CAS: 91722-69-9): 75.00 g/kg
Geraniol (CAS: 106-24-1): 9.00 g/kg
Cymbopogon winterianus oil (CAS: 2304455-69-2): 76.50 g/kg

Instrucciones de uso:
1 collar por animal.
Coloque el collar alrededor del cuello dejando **holgura de 2 dedos**.
Se recomienda colocar el collar una vez esquiladas.
Ajuste y cierre el sistema de sujeción.
Corte el sobrante del collar si procede y elimínelo de forma segura.

Duración de protección:
Hasta 12 semanas por collar.
Sustituir por un collar nuevo cuando finalice la duración o antes si se pierde o se daña.

Recomendaciones de uso:
Colocar preferentemente antes del periodo de mayor presión de moscas.
Revisar el ajuste semanalmente (especialmente en animales jóvenes).
Solo para uso en animales (ovejas y carneros). No usar en otros animales.
No usar en ovinos menores de 4 meses de edad.

*Bibliografía: Remesar S. et al. *Traumatic myiasis by Wohlfahrtia magnifica in sheep flocks from southeastern Spain: prevalence and risk factors.* **Medical and Veterinary Entomology** 36: 30–37.

ESCANEA PARA VER EL PROCESO DE COLOCACIÓN DEL COLLAR

Producto de:

MG2MIX
Zone d'activité de la basse Haye
35220 Châteaubourg - France

By feeka®
Feeka Animal Health S.L.
Sant Ferriol 47, Planta AT
17800 Olot (Girona)
info@feeka.vet

MG COLLAR

La barrera invisible contra insectos voladores

Insectos voladores

NO invasivo

Duración 3 meses

By feeka®

Miasis en ovino

¿Qué es?

La **miasis** es una parasitosis causada por la infestación de tejidos vivos por larvas de moscas (principalmente *Wohlfahrtia magnifica*). Las moscas depositan sus huevos sobre heridas o zonas húmedas y tras la eclosión, las larvas se alimentan del tejido cutáneo y subcutáneo, provocando lesiones de rápida evolución.

Importancia

La miasis es una patología de alto impacto sanitario que compromete de forma importante al bienestar de los animales y consecuentemente la producción y las pérdidas económicas asociadas.
Resulta esencial establecer estrategias preventivas orientadas a reducir la atracción de moscas grávidas y, con ello, el riesgo de miasis.

Temporada de riesgo → DE MAR 03 A NOV 11

Los meses de riego son principalmente finales de primavera, verano y principios de otoño pero puede variar en función de la zona geográfica y las características climatológicas.
La prevención continua durante toda la temporada reduce el riego.

Localización de las lesiones

Genitales → localizacion principal.

MACHOS — Área prepucial (genital): 94,4% de los casos.*

HEMBRAS — Región vulvar y/o perianal: 76,3% de los casos.*

Factores de riesgo

- Adultos > jovenes (machos y hembras).
- Instalaciones deficientes.
- Época de partos / nave de partos.

Prevención en granja

- Revisar animales con frecuencia.
- Mantener instalaciones limpias y secas.
- Tratar heridas y zonas húmedas.
- Identificar y proteger animales de mayor riesgo (adultos y machos).
- Tratamientos preventivos (repelentes).

95,9% de los rebaños presentaron miasis* (SE España)

Pérdidas económicas

Directas

- ↓ Reducción de la fertilidad por lesiones en las zonas genitales (reducción de las montas).
- ↓ Disminución de la ganancia media diaria (producción) por dolor, estrés y menor ingestión.
- Pérdidas de peso
- Degradación de la lana (manchas, roturas)
- Mortalidad o descarte: 1-5% de los animales afectados.

Indirectas

- Coste sanitario: antibióticos, antiinflamatorios, antiparasitarios, desinfectantes locales, insecticidas/larvicidas.
- Mano de obra: Captura y tratamiento individual. Revisiones frecuentes del rebaño. Aumento del manejo durante las temporadas críticas.