


# GUÍA PARA LA TRANSICIÓN DE FENOBARBITAL A PEXION®

Elaborado por el Grupo Asesor de Epilepsia Canina: Sigita Cizinauskas, Robyn Farquhar, Gualtiero Gandini, Jacques Penderis, Kai Rentmeister, Jean Laurent Thibaud, Sandra Tyler, Holger Volk.

## Transición de fenobarbital a PEXION®




1. Ver protocolo de ajuste de dosis con PEXION®.  
2. Tener en cuenta la posibilidad de convulsiones por abstinencia en el periodo de retirada de fenobarbital.  
3. Si tratando con PEXION® a dosis máxima (30 mg/kg) como monoterapia, no hay un adecuado control de los ataques, considerar añadir tratamiento adicional.

4. El rango de ajuste de dosis puede variar de acuerdo al estado clínico de cada paciente.  
5. Considere aumentar la dosis de PEXION®.

# PROTOCOLO DE AJUSTE DE DOSIS CON PEXION®

Elaborado por el Grupo Asesor de Epilepsia Canina: Sigita Cizinauskas, Robyn Farquhar, Gualtiero Gandini, Jacques Penderis, Kai Rentmeister, Jean Laurent Thibaud, Sandra Tyler, Holger Volk.

## Perro con dosis de 10 mg/kg 2 veces al día (ver tabla de dosificación)



\* En caso de ataques severos, la eficacia se observa durante las primeras 48 horas. Ver prospecto para una completa información del producto.

Para cualquier duda relativa al manejo de PEXION® puede contactar con:

**José Gómez**

Servicio Técnico Animales de Compañía

**T. 607 553 573**

El desarrollo de este protocolo ha sido patrocinado por:



Boehringer Ingelheim España, S.A. - División Veterinaria  
Prat de la Riba, 50 - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
[http://www.boehringer-ingelheim.es/products\\_vet.jsp](http://www.boehringer-ingelheim.es/products_vet.jsp)  
mail: [veterinaria@boehringer-ingelheim.es](mailto:veterinaria@boehringer-ingelheim.es) - Tel. 934 045 250 - Fax. 934 045 345



Por todas las razones.