

## antiinflamatorios no esteroideos





Antiinflamatorios flyer sep19 v3.indd 1 26/9/19 19:41



antiinflamatorios esteroideos



Prednisolona Fatro

 Indicado para el tratamiento de alergias, dermatitis, artritis y bursitis.

Vía de administración y posología:



- Intramuscular: 10-30 mg / animal en dosis única. (equiv. a 0,4-1,2 ml / animal)
- Intrarticular: 10-20 mg en dosis única. (equiv. a 0,4-0,8 ml)



Gatos

• Intramuscular: 2,5 - 5 mg / animal en dosis única (equiv. a 0,1-0,2 ml /animal)



Rapidexon

Dexametasona 2mg/ml en solución inyectable

- Indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios y alérgicos
  - Perros y gatos: por vía IM, 0.1 mg/kg p.v., equivalente a 0.5 ml/10 kg



Deyanil<sup>®</sup>
Retard

Dexametasona isonicotinato 1 mg en suspensión inyectable

- Indicado en inflamaciones, alergias, traumatismos, shock y colapso circulatorio
  - Perros: por vía IM,
     0,05-0,2 mg/kg p.v. en dosis única
     (equivalentes a 0,5-2 ml /10 kg p.v.)

10 ml y 50 ml.

50 ml.

La salud animal en manos del Veterinario

Fatro SpA.

40064 • Ozzano Emilia • Bolonia • ITALIA

Fatro Ibérica

vet@fatroiberica.es www.fatroiberica.es



Antiinflamatorios flyer sep19 v3.indd 2 26/9/19 19:41