

Deltametrina en una matriz innovadora de color gris y sin fragancia



Seguridad anti-estrangulamiento



Pack de 2 collares, mayor ahorro



Tamaños adaptados a cada perro



Avanzada tecnología de liberación continua



Flebotomos y otros parásitos



ABRAZA UN NUEVO
CONCEPTO DE COLLAR
ANTIPARASITARIO

¿CÓMO USAR PREVENDOG®?

1 Saca el collar del sobre. Sosteniendo el cierre principal con una mano, separa la tira protectora.



4 Presionando el cierre principal, haz pasar todo el collar. Ajústalo de manera que, entre collar y cuello, puedas colocar dos dedos. Así, el perro no está incómodo y el collar actúa mejor.

2 Coloca el collar alrededor del cuello del perro.



5 Repite el procedimiento, pasando el collar por el segundo y el tercer cierre.



Sosteniendo el cierre principal entre el pulgar y el índice, presiona ligeramente para facilitar el paso del otro extremo.



6 Corta el extremo sobrante en diagonal, dejando 5-7 cm para ajustes posteriores.



Después de colocar el collar, lávate las manos. No dejes que los niños jueguen con el collar. Para una protección continua, reemplaza el collar cada 5-6 meses.





perniciosus) durante 5 meses y de mosquito (*C. pipiens*) durante 6 meses. **DOSIS** Un collar/perro. **CONTRAINDICACIONES**Cachorros de menos de 7 semanas de edad. Hipersensibilidad a la sustancia activa/excipientes. No usar en gatos ni perros con lesiones en la piel. **ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES** Aplicar 1 semana antes de la exposición. No ingerir. No permitir que los niños se lo pongan en la boca. Lavarse las manos después de su colocación. Evitar el contacto prolongado con el collar. En caso de exposición oral accidental o ingestión, solicitar asesoramiento médico. Aunque el contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar, la deltametrina es tóxica para los peces y otros organismos acuáticos. No permitir que los perros con el collar se bañen en los cursos de agua. No usar durante la gestación. Puede utilizarse durante la lactancia. No usar con otros parasiticidas piretroides u organofosforados. En caso de ingesta accidental pueden aparecer síntomas de intoxicación: movimientos descoordinados, temblor, hipersalivación, vómitos, rigidez de los cuartos traseros que suelen disminuir dentro de 48 horas. Contactar con el veterinario. **REACCIONES ADVERSAS** En raras ocasiones pueden aparecer reacciones locales de la piel (prurito, eritema, pérdida del pelo) en el cuello o en la piel en general. En casos muy raros alteraciones del comportamiento (por ejemplo, letargo o hiperactividad) a menudo asociado con la irritación de la piel, síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea e hipersalivación) y problemas neuromusculares (ataxia y temblor del músculo). Los síntomas disminuyen a las 48 horas de retirar el collar. **FORMATOS** Cajas con 1 y 2 collares. **TITULAR** Vetpharma Animal Health. **REGISTRO** PREVENDOG 0,636 g (3730 ESP). PREVENDOG 1,304 g (3728 ESP). PREVENDOG 1,056 g (3729 ESP).

Virbac responde

933 716 373 © 616 764 990
virbac.responde@virbac.es









CAMBIA A PREVENDOG® EL NUEVO COLLAR ANTIPARASITARIO CON GRANDES VENTAJAS



DELTAMETRINA EN UNA MATRIZ INNOVADORA



- Collar con deltametrina al 4%.
- Actúa por contacto, ofreciendo hasta 6 meses de protección contra garrapatas (*I. ricinus*, *R. sanguineus*) y mosquitos y 5 contra flebotomos.
- Matriz de color gris, sin fragancia y de superficie lisa, atributos muy valorados por los propietarios de perros.¹
- El contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar.

SEGURIDAD ANTI-ESTRANGULAMIENTO



- La elasticidad del collar combinada con el sistema de triple cierre permite una rápida liberación, sin romperse, si el perro queda atrapado.
- Tranquilidad para tus clientes.

Sistema de triple cierre



PACK DE 2 COLLARES MAYOR AHORRO



Cada collar protege de 5 a 6 meses frente a los principales parásitos que amenazan la salud del perro

- Flebotomos. 5 meses de protección cada collar.
- Mosquitos. 6 meses de protección cada collar.
- Garrapatas. 6 meses de efecto acaricida cada collar.
- Para una protección continua, reemplaza el collar cada 5-6 meses.

AVANZADA TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN CONTINUA



- El proceso de moldeado a temperaturas moderadas logra una textura homogénea de la matriz para una liberación continua del fármaco.
- La deltametrina se libera desde el collar hacia la película grasa que cubre la piel, extendiéndose sobre la superficie de la piel a través de los lípidos y el pelo.
- Gracias a su formulación, actúa con la capa lipídica de la piel, distribuyendo deltametrina por todo el cuerpo.

PROTEGE Y REPELE FLEBOTOMOS Y OTROS PARÁSITOS



Flebotomos

Prevendog[®] tiene un efecto repelente (anti-alimentación) contra los flebotomos (*Phlebotomus perniciosus*), vectores de la leishmaniosis canina.

Mosquitos

Gracias a su acción repelente (anti-alimentación), Prevendog® es muy eficaz contra picaduras de mosquitos como *Culex pipiens*, vector de la enfermedad del gusano del corazón (*Dirofilaria immitis*) y de enfermedades de los gusanos de la piel (*Dirofilaria repens*).

Garrapatas


Su acción acaricida también protege contra garrapatas, incluyendo *Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus sanguineus*. Las garrapatas pueden propagar la enfermedad de Lyme y otras enfermedades.

TAMAÑOS ADAPTADOS A CADA PERRO



Elige el collar que mejor se adapta a cada perro

L+XL (más de 25 kg) · 75 cm, para cuellos de hasta 65 cm.



XS (hasta 5 kg) · 35 cm, para cuellos de hasta 28 cm.



