

SoriaNatural®
EFICACIA Y CALIDAD



PREGUNTAS FRECUENTES



ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL DE PRODUCTOS	3
LEISHWOW	3
PROSTAWOW	5
CALCUWOW	5
CISTIWOW	6
OCUWOW	6
HEPATOWOW	8
CBD WOW	8
INTESWOW	9
URIWOW	10
TRAVELWOW	10
GASTROWOW	10

INFORMACIÓN GENERAL DE PRODUCTOS

- **Disponibilidad:** Los productos WowZen se encuentran en clínicas veterinarias. Para ubicar puntos de venta específicos, se puede solicitar la zona al cliente.
- **Información de composición:** La composición detallada, incluyendo principios activos y excipientes, está disponible en las fichas técnicas, en la caja del producto, en la web www.sorianatural.es y también en nuestra App disponible para Android e iOS. En ambas se puede consultar la enciclopedia de plantas con información detallada de más de 200 referencias, incluidas las utilizadas en las referencias de WowZen.

LEISHWOW

Puntos Clave: Leishwow contiene extracto de *Artemisia annua* (4:1). Su eficacia está ligada a la proporción correcta de artemisinina, casticina y otros principios activos. Es un producto leishmanicida (capaz de matar directamente a los parásitos), no leishmanioestático (que solo inhibe su multiplicación o crecimiento), y además actúa como activador del sistema inmunológico.

- **Protocolo de administración y duración:**
 - **Pauta (Dosificación):** 1 comprimido por el peso especificado (10kg, 20kg o 30kg) cada 12 horas, preferiblemente en ayunas, en semanas alternas (una semana de administración, una semana de descanso).
 - **Duración:** El tratamiento debe mantenerse el tiempo necesario hasta que los signos clínicos mejoren y el proteinograma se normalice. Puede continuarse como mantenimiento después de la normalización para mantener una inmunidad celular óptima.
 - **Dosis única diaria:** No es recomendable, ya que la biodisponibilidad no sería mayor. Lo ideal es administrar cada 12 horas para una mejor eficacia.
- **Ajuste dosis:**
 - **Peso entre formatos:** Perros de más de 5kg y hasta 10kg: Leishwow 10kg. Para perros de más de 15kg y hasta 20kg: Leishwow 20kg. Para perros de más de 25kg y hasta 30kg: Leishwow 30kg. Para pesos intermedios se pueden combinar comprimidos de diferentes formatos (ej., un comprimido de 10kg y medio de 10kg para un perro de 15kg, o 3/4 de un comprimido de 20kg para un perro de 15kg)
 - **Dosis mayores:** La dosis puede aumentarse de forma segura hasta 5 veces la dosis inicial recomendada en casos graves o si no se observa mejora clínica.
- **Monitorización del tratamiento:**
 - **Proteinograma:** Es el indicador clave para la evolución de la enfermedad y la efectividad del tratamiento, especialmente las gammaglobulinas, que reflejan la inmunidad celular (Th1). Los cambios suelen observarse antes del tercer mes de tratamiento.

- **Serología/Títulos de anticuerpos:** Útiles como referencia, pero no indican directamente la evolución de la enfermedad y tardan más en normalizarse.
- **Frecuencia de controles:** Siempre deben realizarse valorando el estado del animal y siguiendo el criterio del veterinario clínico.

- **Combinaciones con otros medicamentos:**
 - **Alopurinol (Zyloric):** Compatible y muy recomendable. Estudios demuestran que la combinación de Leishwow con alopurinol acelera la mejora tanto en los análisis de laboratorio como en los títulos de anticuerpos.
 - **Domperidona:** No es necesario combinarla con Leishwow, ya que *Artemisia annua* por sí misma estimula la inmunidad celular.
 - **Glucantime/Milteforan (otros leishmanicidas):** Aunque no son incompatibles, generalmente no se recomienda combinar dos leishmanicidas simultáneamente debido al riesgo de muerte masiva del parásito y depósito de inmunocomplejos. Se prefiere elegir uno u otro si bien no se ha demostrado esta afirmación.
 - **Impromune/Leisguard:** Leishwow puede combinarse con Impromune. Leisguard podría no ser necesario, ya que *Artemisia annua* estimula la inmunidad celular de manera similar.
 - **Doxiciclina (para Ehrlichia):** Compatible.
 - **Corticoides:** Pueden usarse concomitantemente.

- **Efecto en enzimas hepáticas:** No se han observado alteraciones en las enzimas hepáticas en los casos tratados y siempre que se hayan respetado las pautas de dosificación.
- **Oxidación de comprimidos:** Si un comprimido partido se oscurece, es probable que se deba al contacto con agua o alta humedad, ya que no están grajeados. Sin humedad, no deberían cambiar de color.
- **Uso en pacientes con cáncer:** Aunque Leishwow refuerza el sistema inmune, no está diseñado específicamente para el cáncer. Se recomienda consultar con un veterinario, ya que la respuesta del organismo a la estimulación inmunitaria en casos graves puede ser impredecible. (En PubMed existen 229 estudios con *Artemisia annua* en diferentes tipos de cáncer en humanos que indican su efecto antitumoral tanto in vitro como in vivo, por ejemplo en cáncer de pulmón, mama, endometrio y tumores cerebrales).
- **Uso en dirofilariosis:** Aunque *Artemisia annua* potencia el sistema inmune, su acción principal es leishmanicida (destruye el parásito). No está indicado para la dirofilariosis.
- **Uso en hembras gestantes:** No debe administrarse a hembras gestantes bajo ningún concepto.

PROSTAWOW

Puntos clave: Indicado para la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) y sus signos clínicos asociados.

- **Protocolo de administración y duración:** Administrar de forma continua hasta observar la respuesta deseada (reducción del tamaño prostático, mejora de síntomas como dolor, polaquiuria, estranguria, hematuria). Tratamiento mínimo 6 meses
- **Inicio del efecto:** Los efectos sobre los síntomas asociados se notan en pocos días. La acción sobre el tamaño prostático se observa típicamente después de dos meses de tratamiento y a los seis meses se observa una reducción significativa.
- **Combinación con Calcuwow:** El extracto de rompepiedras, tiene gran efecto antiinflamatorio sobre la próstata, de manera que Calcuwow puede servir de apoyo en los casos en los que Prostawow “se quede corto”

CALCUWOW

Puntos Clave: Indicado principalmente para disolver y prevenir cálculos de oxalato cálcico. También ayuda en otras urolitiasis por su acción diurética.

- **Tipos de cálculos:** Especialmente efectivo para cálculos de oxalato cálcico. Puede ser de apoyo para otras urolitiasis al promover la diuresis.
- **Disolución y prevención:** Ayuda tanto a disolver los cálculos del oxalato cálcico existentes como a prevenir la formación de nuevos.
- **Dosificación:**
 - **Perros:** 0.5 mL por cada 10 kg de peso, cada 12 horas.
 - **Gatos:** 0.2 mL por cada 2 kg de peso, cada 12 horas.
- **Períodos de descanso:** Es importante respetar los períodos de descanso. Puede tomarse durante 3 meses, seguido de 1 mes de descanso, y luego reanudar por otros 3 meses.
- **Efectos secundarios:** No se han observado efectos secundarios comunes. Si se presentan vómitos, diarrea o micción inadecuada, podría deberse a hipersensibilidad individual o a otra causa. Se recomienda retirar el producto unos días, y reintroducirlo gradualmente a una dosis menor si los síntomas remiten.
- **Interacción con la dieta:** Los cálculos de oxalato cálcico no se disuelven con la dieta pero sí que lo hacen los cálculos de estruvita, Calcuwow complementa, pero no sustituye, una dieta veterinaria específica.
- **Tamaño de los cálculos:** No se establece un tamaño mínimo o máximo para su eficacia.
- **Uso en conejos y cobayas:** El producto está diseñado para perros y gatos. Aunque los ingredientes (*Lepidium latifolium*) se han estudiado en roedores, no hay estudios específicos con Calcuwow en conejos o cobayas. Su uso en estas especies queda a criterio del veterinario, ajustando la dosis al peso. Suspender si aparecen síntomas

secundarios.

- **Combinación con Prostawow:** El extracto de rompedpiedras, tiene gran efecto antiinflamatorio sobre la próstata, de manera que Calcuwow puede servir de apoyo en los casos en los que Prostawow “se quede corto”.

CISTIWOW

Puntos clave: Formulado con hibisco y arándano rojo para ayudar en infecciones urinarias (ITU).

- **Uso en infecciones del tracto urinario:** Eficaz para ITU. Tiene acción antibiótica "per se" y puede combinarse con tratamientos antibióticos convencionales si es necesario.
- **Uso en Cistitis idiopática felina:** Asociada al estrés. Por ello se aconseja la combinación de Cistiwow con Travelwow
- **Efecto en pH:** Favorece o mantiene un pH ácido en la orina y apoya la salud vesical.
- **Protocolo de administración:** Puede usarse también como preventivo con la dosificación descrita. Puede administrarse regularmente, no solo cuando hay signos clínicos.
- **Contraindicaciones:** No se mencionan contraindicaciones específicas para gatos con enfermedad renal.
- Cistiwow puede ser útil para acidificar las vías urinarias y ayudar/sumar junto a la dieta específica para eliminar cálculos de estruvita.

OCUWOW

Puntos clave: Para la salud ocular, especialmente en casos de Queratoconjuntivitis Seca (QCS). Además, Ocuwow puede usarse como coadyuvante en cualquier patología que curse con dolor, inflamación y/o infección. Decidir si es o no el único tratamiento dependerá de la patología y la respuesta al mismo.

- **Inicio del efecto:** Muy rápido, se observa confort visual y acción analgésica/antiinflamatoria en pocos días.
- **Producción de lágrima:** No en todos los casos se observa un aumento rápido en la producción de lágrima, pero sí una mejora significativa en su calidad.
- **Uso a largo plazo:** Puede administrarse de forma crónica sin interrupción si los resultados son satisfactorios.
- **Como terapia adyuvante:** En algunos casos, puede no ser el único tratamiento, sino un coadyuvante.

- **Dosificación en gatos:** Se puede administrar a gatos. Medio comprimido en gatos de hasta 4kg de peso cada 24 horas. En gatos de más de 4kg, un comprimido cada 24 horas.
- **Períodos de descanso:** Inicialmente se consideraban descansos de 2 semanas cada 3 meses, pero la experiencia actual sugiere que el tratamiento continuo e ininterrumpido es más efectivo y ha mostrado buenos resultados.

RESPIWOW

Puntos Clave: Diseñado para ayudar en condiciones respiratorias.

- **Para gatos:**
 - **Problemas de administración (babeo, náuseas):** Algunos gatos pueden salivar excesivamente o sentir náuseas debido al sabor u olor del producto. Esto se debe generalmente a la idiosincrasia individual del animal, no a un problema con el lote. También puede existir hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. En este caso, se recomienda pausar su administración.
 - **Consejos de administración:** Puede mezclarse con alimento húmedo tipo paté, golosinas líquidas o una pequeña cantidad de helado. Administrar lentamente con una jeringa si se da directamente.
 - **Combinación con corticoides (Fluticasona):** No es necesaria una transición. Introducir Respiwow y reducir progresivamente la dosis de corticoides a medida que el animal responda clínicamente, pero la retirada debe hacerse según el criterio del veterinario.
 - **Uso crónico:** Puede administrarse de forma ininterrumpida hasta la resolución del problema. Si no hay crisis en un mes, se puede interrumpir y reanudar si los síntomas reaparecen.
 - **Uso en bronquitis crónica/asma:** Ha mostrado buenos resultados en casos de asma felina tratados con corticoides orales que presentaban recaídas constantes. (Con descansos mensuales/quincenales cada 3 meses).
 - **Uso con EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal):** La composición de Respiwow para gatos no afecta el sistema digestivo, por lo que puede usarse en gatos con EII. Los posibles efectos secundarios dependerían de la tolerancia individual a los componentes de las plantas, pero no se esperan problemas digestivos específicos.
 - **Edad de administración:** Puede administrarse a gatos recién nacidos en la misma dosis (0.2 ml/2 kg/24h). Para animales muy pequeños, puede diluirse en agua.

- **Para perros:**
 - **Estornudo inverso ("Reverse Sneezing"):** No es su indicación específica, pero al ser antiinflamatorio y antitusígeno, podría ayudar a aliviar algunos síntomas.
 - **Broncodilatador/Broncomalacia:** No es un broncodilatador. Sus propiedades son espasmolíticas, expectorantes, antifúngicas y antibacterianas. No está indicado como tratamiento principal para la broncomalacia, aunque puede aliviar síntomas como la tos o el moco producido por infecciones secundarias.
 - **Uso en nebulizadores:** No puede usarse en nebulizadores.

HEPATOWOW

Puntos Clave: Contiene cardo mariano, conocido por su apoyo hepático. (y todo lo que ello supone como regulación de niveles de transaminasas, triglicéridos, colesterol, etc...)

- **Dosificación para perros pequeños:** Para un perro de 5kg, se recomienda usar el formato de 10kg y administrar la mitad de la dosis indicada en la caja (ej., medio comprimido cada 12 horas).
- **Información general:** Puede usarse el tiempo necesario hasta normalizar los valores hepáticos, e incluso como preventivo.
- **Interacción con otros protectores hepáticos (ej., Prolivet):** No se han descrito incompatibilidades entre los componentes de Hepatosil y Artiwow. Si aparecen síntomas al administrarlos juntos, se recomienda suspender y reevaluar.
- **Uso en problemas dermatológicos:** en numerosas ocasiones los problemas atópicos de piel —especialmente aquellos que cursan con picor— tienden a mejorar cuando se acompaña el tratamiento con un apoyo hepático, como el cardo mariano. Esto se debe a que una correcta función hepática contribuye a la eliminación de toxinas y a la regulación del sistema inmunológico, factores clave en muchas afecciones dermatológicas.

CBD WOW

Puntos Clave: Contiene 5% de CBD.

- **Estatus legal y administración (España):** Legalmente, en España, solo está permitido para uso tópico, de ahí el modo de empleo de CBD Wow. Sin embargo, el uso oral sí está permitido en otros países de la UE, Canadá y EE.UU. Su indicación queda a criterio veterinario.

- **Aplicación tópica:** Puede aplicarse en diversas zonas (detrás de la oreja, en la mandíbula) según la afección. Es importante que la pipeta no toque la piel o la lengua para evitar contaminar el producto.
- **Dosificación (tópica):** Iniciar con 1 a 2 gotas cada 12 horas. Si no se observan reacciones adversas después de 3-7 días, aumentar gradualmente la dosis hasta un máximo de 4 gotas por aplicación (8 gotas al día). El ajuste de la dosis se basa en la respuesta del animal. No hay una dosificación específica por peso para uso tópico.
- **Indicaciones (tópicas):** Principalmente para problemas locales (ej., dolor musculoesquelético). Para efectos sistémicos (epilepsia, ansiedad), aunque posible por absorción oral en países donde es legal, no es la vía recomendada legalmente en España para este producto de Soria Natural.
- **Combinación con Artiwow:** Pueden combinarse sin problema.
- **Método de extracción:** Se utiliza extracción por CO2 Supercrítico, garantizando un producto puro y libre de residuos químicos.

INTESWOW

Puntos Clave: Diseñado para diarreas agudas.

- **Indicaciones:** Específicamente para diarreas agudas de diversas etiologías y apoyo para mejorar la condición física y consistencia de las heces en procesos crónicos. Trata el síntoma, no necesariamente la causa subyacente.
- **Duración:** En diarreas agudas no se recomienda para tratamientos prolongados. Si no hay respuesta en 5 días, suspender y reevaluar el diagnóstico. En diarreas crónicas puede utilizarse prolongadamente para mejorar la condición del paciente y la consistencia de las heces.
- **Combinación con otros tratamientos:** No interfiere con tratamientos convencionales. Puede usarse solo o como coadyuvante.
- **Efecto en sistema urinario:** No tiene relación con el sistema urinario; puede administrarse a animales con infecciones urinarias.
- **Uso de Gastrowow:** Es recomendable incorporar el uso de Gastrowow una vez resuelta la diarrea, especialmente en aquellos casos en los que esta haya sido provocada por un agente microbiológico, como bacterias o virus. Los dos componentes de Gastrowow poseen efectos antibacterianos, antivíricos y moduladores del sistema inmunológico, lo que contribuye a estabilizar y fortalecer el aparato digestivo. De este modo, se reduce el riesgo de recidivas y de posibles alteraciones digestivas posteriores al episodio diarreico.

URIWOW

Puntos Clave: Indicado para la incontinencia urinaria.

- **Indicaciones:** Para incontinencia urinaria, independientemente de la causa, aunque su acción estrogénica lo hace útil en incontinencias hormonales.
- **Ajuste de dosis:** Puede mantenerse o duplicarse la dosis (ej., el doble de la dosis recomendada una vez cada 24 horas en lugar de la dosis estándar cada 12 horas) según la respuesta. No se necesita transición al cambiar de otros medicamentos para la incontinencia. Se recomienda administrar por la noche antes de dormir.
- **Uso a largo plazo:** Puede administrarse a largo plazo.

TRAVELWOW

Puntos Clave: Para la ansiedad y náuseas relacionadas con los viajes o con otras situaciones que causen estrés como mudanzas, petardos, etc.

- **Combinación con Cerenia:** No es necesario combinarlo con Cerenia, ya que Travelwow tiene propiedades antieméticas.
- **Programa de administración:** Si se va a viajar, se recomienda administrar al menos 3 días antes del viaje, generalmente una vez cada 24 horas.
- **Efectos:** Proporciona un efecto ansiolítico sin sedar al animal ni mermar sus capacidades. El jengibre ayuda con las náuseas y los vómitos.
- **Muy útil asociado con el Cistiwow** en la cistitis idiopática felina ya que suele tener casi siempre un origen nervioso.

GASTROWOW

- **Omeprazol:** Puede sustituir al omeprazol ya que una de sus principales aplicaciones es como protector gástrico. (Omeprazol bloquea la bomba de protones y, por tanto, la producción de HCl del estómago, algo que es clave al inicio del proceso de la digestión).
- **Uso en vómitos:** Aunque no es su indicación principal, puede ayudar si el vómito es causado por una gastritis.
- **Estreñimiento:** No se ha descrito este efecto. Al contrario, las plantas de su composición favorecen la motilidad intestinal.