



FICOXIL

SURFEA LA OLA DEL DOLOR

Comprimidos masticables de firocoxib para perros

Along with you

FICOXIL

Comprimidos masticables de firocoxib para perros

FIROCOXIB

FICOXIL contiene como principio activo firocoxib. Pertenece al grupo farmacológico de los AINEs, concretamente a los Coxibs.

El Firocoxib tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas que alivian el dolor y la inflamación.^{1,2}

FICOXIL está indicado en:

- **Dolor e inflamación asociados a osteoartritis.**
- **Dolor post-operatorio e inflamación asociada a cirugías de tejido blando, ortopédicas u odontológicas.**

La articulación de la rodilla es similar a la rodilla humana. Los ligamentos mantienen los huesos en su lugar. Esta articulación se lesiona comúnmente.

El hombro es una articulación esférica. Este es un sitio común para problemas de "desgaste"

El corvejón es similar a la articulación del tobillo humano. Estos huesos están bajo estrés cuando el animal corre y salta.

En la articulación del codo, se juntan 3 huesos en forma de bisagra apretada. Puede haber una malformación de esta articulación.




El objetivo del tratamiento es reducir el dolor y la inflamación, aumentando así la movilidad y la calidad de vida del perro





SURFEA LA OLA DEL DOLOR



Blíster perforado

Para facilitar su dispensación.



Las presentaciones clásicas

57 mg y 227 mg



Easy-tab

Pueden partirse en 2 o 4 partes iguales.



Comprimidos masticables y palatables


Con sabor a ternera.



Alto margen de seguridad ^{3,4}



Hipoalergénico y libre de gluten



FICOXIL es un inhibidor selectivo de COX-2⁵

Peso corporal (kg)	Ficoxil 227 mg	
	Número de comprimidos	Icono
10-17	1/4	☐
> 17-28	1/2	◐
> 28-39	3/4	◑
> 39-51	1	●
> 51-62	1+1/4	●◐
> 62-73	1+1/2	●◑
> 73-85	1+3/4	●◒
> 85-96	2	●●

Peso corporal (kg)	Ficoxil 57 mg	
	Número de comprimidos	Icono
3-4	1/4	☐
> 4-7	1/2	◐
> 7-10	3/4	◑
> 10-12,5	1	●
> 12,5-15,5	1+1/4	●◐
> 15,5-18,5	1+1/2	●◑
> 18,5-21	1+3/4	●◒
> 21-24	2	●●

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

OSTEOARTRITIS: Los estudios de campo se han realizado a 90 días. Un tratamiento más largo debe llevarse con cuidado y con una revisión regular del veterinario.

ALIVIO DEL DOLOR POST-OPERATORIO: Hasta 3 días si es necesario, empezando dos horas antes de la cirugía.

El tratamiento no debe interrumpirse hasta unos días después de la desaparición completa de los síntomas.



POSOLÓGIA

5 mg /kg peso vivo
Una vez al día

FICOXIL

Comprimidos masticables de firocoxib para perros

SURFEA LA OLA DEL DOLOR

COMPRIMIDOS EASY-TAB
PALATALES E HIPOALERGÉNICOS
ENVASES A MEDIDA PARA TU CLÍNICA



FICOXIL
Comprimidos masticables para perros
Firocoxib 57 mg y 227 mg

Especies
Perros.

Indicaciones
Para el alivio del dolor e inflamación asociados a osteoartritis en perros. Para el alivio de dolor e inflamación postoperatorios en cirugías de tejido blanco, ortopédicas y odontológicas.

Posología y administración
Administración oral.

Osteoartritis: Administrar 5 mg / kg peso corpora, una vez al día.

La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. Como los estudios de campo se limitaron a 90 días, se debe considerar cuidadosamente un tratamiento a más largo plazo y el veterinario debe realizar un seguimiento regular.

Alivio del dolor postoperatorio: Administrar 5 mg / kg de peso corporal una vez al día, hasta 3 días según sea necesario, iniciando el tratamiento aproximadamente 2 horas antes de la cirugía.

Después de la cirugía ortopédica y dependiendo de la respuesta observada, puede mantenerse el tratamiento más de 3 días, a criterio del veterinario. Los comprimidos pueden dividirse en 2 o 4 partes iguales para asegurar una dosificación precisa. Los comprimidos se pueden administrar con o sin comida.

Contraindicaciones
No usar en perras gestantes o lactantes. No usar en animales de menos de 10 semanas de edad o de menos de 3 kg de peso corporal. No usar en animales que padezcan sangrado gastrointestinal, discrasia sanguínea o trastornos hemorrágicos. No usar concomitantemente con corticosteroides u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Caducidad
3 años

Caducidad del comprimido una vez abierto el blíster
7 días.

Almacenamiento
No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Referencias

1. Aragon C, Hofmeister E, Budsberg S. 2007. Systematic review of clinical trials of treatments for osteoarthritis in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association; 230 (4): 514-521.
2. Hanson P, Brooks K, Case J, et al. 2006. Efficacy and safety of firocoxib in the management of canine osteoarthritis under field conditions. Veterinary Therapeutic; 7(2): 127-140.
3. Wooten J, Bliklager A, Marks S et al. 2009. Effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs with varied cyclooxygenase-2 selectivity on cyclooxygenase protein and prostanoid concentrations in pyloric and duodenal mucosa of dogs. American Journal of Veterinary Research; (10):1243-1249.
4. Lascelles B, McFarland J, Swann H. 2005. Guidelines for safe and effective use of NSAIDs in dogs. Veterinary Therapy; 6: 237-251.
5. Budsberg S. 2015. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. Handbook of Veterinary Pain Management; 8: 142-160.